

Teilbarkeit & Zermörserbarkeit oraler Arzneimittel, sowie Hinweise zur Sondenapplikation

1. Allgemeine Hinweise

- Tabletten dürfen nicht ohne weiteres geteilt, zermörsert oder suspendiert werden, selbst wenn eine Bruchrille vorhanden ist. Vorsicht ist vor allem bei retardierten oder magensaftresistenten Tabletten und Kapseln, bei instabilen Wirkstoffen (Vitamine A, B, C) oder irritierenden Substanzen wie z.B. Eisen, KCl oder Alendronsäure (Fosamax®) geboten.
- Arzneimittel dürfen – falls erlaubt – erst kurz vor der Applikation geteilt, zermörsert oder gelöst werden, da die Wirkstoffe durch Luft, Feuchtigkeit oder Licht inaktiviert werden können.
- Benutzen Sie wenn möglich einen Tablettenteiler (erhältlich im Zentralmagazin) zum Teilen der Tabletten.
- Die vorliegende Tabelle wurde nach sorgfältiger Recherche zusammengestellt. Es wird jedoch keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben übernommen. Pharmakokinetische Studien wurden in der Regel nicht durchgeführt.
- kA = keine Angaben

2. Arzneimittelgabe über eine Ernährungssonde

- Wenn möglich sollte auf eine andere Applikationsform (rektal, sublingual oder transdermal) ausgewichen werden.
- Bei Arzneimittelgabe durch die Sonde sollten möglichst flüssige Darreichungsformen gewählt werden (Tropfen, Sirup, Suspensionen).
- Bei Duodenal- oder Jejunal-Sonden müssen möglichst isotonische Lösungen verabreicht werden. Daher sind Lösungen, Sirupe oder Suspensionen immer 1:5 oder 1:10 zu verdünnen (maximal 50 ml Flüssigkeit als Bolus geben, sonst ist mit Diarrhöe zu rechnen).
- Die Lage der Sonde (gastral/duodenal/jejunal) ist mit dem Wirk- bzw. Resorptionsort des Wirkstoffs abzustimmen.
- Parenterale Formen können meist ebenfalls appliziert werden, sind aber in der Regel teuer.
- Tabletten müssen – wenn erlaubt – vor der Gabe durch die Sonde fein zermörsert und in Wasser suspendiert werden.
- Arzneimittel dürfen nicht mit der Nahrung, sondern müssen separat verabreicht werden. Vor und nach der Gabe muss die Sonde gespült werden.
- Mehrere Arzneimittel nicht mischen, sondern nacheinander geben. Zwischen den einzelnen Applikationen muss ebenfalls gespült werden.
- Zum Spülen der Sonde und zum Verabreichen von Medikamenten sollte nur Wasser verwendet werden (am besten Mineralwasser ohne Kohlensäure).

3. Quellen

- Arzneimittel-Kompendium® der Schweiz
- Herstellerfirmen
- Pharmatrix
- Warlich R, Dörje F, Brüngel M. Medikamentenapplikation bei Sondenernährung, Pfrimmer NUTRICIA

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Apotheke. Die Tabelle enthält auch Angaben zu Arzneimitteln, die die Spitalapotheke nicht im Sortiment führt.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
ACIMETHIN 500 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja		Filmreste abtrennen (bei Applikation in feinen Sonden)
ACYCLOVIR MEPHA 200 MG : Tabletten	Ja	Ja, Wirkstoff schwer löslich	Ja	--	Sondenapplikation möglich
ADALAT CR RETARD 20 und 60 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	
AKINETON 2 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	gemörsert als Pulver mit viel Flüssigkeit einnehmen (bitterer Geschmack). Alternative: Akineton Ampullen (2 Ampullen entsprechen 5 Tabletten à 2 mg)
ALDACTONE 25, 50 und 100 MG : Tabletten	Ja	Siehe Bemerkung	Ja	--	Achtung: bitterer Geschmack. Eine Suspension kann durch Zermahlen von Aldactone Tabletten und Aufnahme in etwas Glyzerin und Verdünnung in einem Sirup hergestellt werden.
ALDOMET 250 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Nein	Ja	--	Keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden
ALKERAN 2 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Zytostatikum!
ALLOPUR 100 und 300 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Sondenapplikation: gemörserte Tabletten in 10ml Wasser suspendieren (Minstdurchmesser Sonde 6.5 CH)
AMARYL 2 und 3 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	Keine Studien zur Pharmakokinetik und Bioverfügbarkeit
AMIODAR 200 MG : Tabletten	Ja	Ja, innert 5 min, jedoch Flockenbildung	Ja	--	Durch Flockenbildung verstopfen die Sonden leicht. Suspension daher mehrmals aufschütteln und mit mind. 2x 15 ml Wasser spülen. Sondendurchmesser mindestens 8 CH.
AMLODIPIN SANDOZ 5 u, 10 MG : Tabletten	Ja	kA	kA	--	



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
AMOXI-MEPHA 1000 : Lactabs	Ja (Bruchrille)	Ja	kA	--	Tabletten mit Bruchrille. Die Tabletten können in Leitungswasser suspendiert (Zerfall innerhalb einer Minute) und sofort eingenommen werden. Alternative: Amoxi-Mepha Suspension
AMPHO-MORONAL 10 MG : Lutschtabletten	Nein	Nein	Nein	--	
ANAFRANIL 25 MG : Dragees	Ja, jeschwierig bei Dragées	kA	Ja	--	Sofort nach Zermörsern und suspendieren anwenden!
ANAFRANIL SR 75 : Divitabs 75 mg	Ja	Nein	Nein	--	teilbar, aber nicht zerkleinern
ANDREAFOL (0.4 MG FOLSÄURE) : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja	Ja		zum Trinken auflösbar, jedoch nicht für Sonde
ANGIDIN (PFEFFERMINZAROMA) : Lutschtabletten	Ja	Nein	Nein	--	
ANTABUS 400 MG : Tabletten	Ja	Ja, in Wasser löslich	Ja	--	Keine Angaben zur Pharmakokinetik und Bioverfügbarkeit
ANVITOFF 500 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	In Wasser und Fruchtsäften auflösbar. Orale Gabe der Ampullen möglich.
ANXIOLIT 15 MG : Tabletten	Ja	kA	kA	--	Tabletten mit Bruchrille
ANXIOLIT 15 MG : Tabletten	Ja	kA	kA	--	Tabletten mit Bruchrille
APROVEL 150 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja		
ARICEPT 5 und 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden!
ARILIN 500 MG : Filmtabletten	Ja	kA	Nein	--	Unzerkaut schlucken (unangenehmer Geschmack)
ARIMIDEX 1 MG : Tabletten	(Ja)	Nein	Ja, siehe Bemerkung	--	kann mit Fruchtsaft oder Joghurt gemischt werden. Sondenapplikation möglich. Achtung Zytostatikum!
ASASANTIN RETARD 200 / 25 MG : Kapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	Kapselinhalt kann suspendiert werden, Pellets nicht zerkleinern!
ASPIRIN 500 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Nach der Einnahme mindestens ein Glas Wasser geben.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
ASPIRIN CARDIO 100 und 300 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tablette mit magensaftresistentem Überzug (erhöht Magenverträglichkeit). Nach der Einnahme mindestens ein Glas Wasser trinken. Alternative: Aspegic Sachets
ATACAND 8 und 16 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	
ATACAND PLUS 16/12.5 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	
ATARAX 25 MG : Filmtabletten	Ja	Ja	Ja	--	Alternative: Atarax Sirup
AUGMENTIN 1 G : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Mörsern nicht nötig, die Tablette zerfällt in Wasser. Alternative: Augmentin Suspension.
AUGMENTIN 375 und 625 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Zermörsern und Einnahme mit Wasser möglich. Nicht in Fruchtsaft oder Joghurt einnehmen (Säure). Vorschlag: Augmentin Suspension.
AURORIX 150 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Sondenapplikation möglich. Erfahrungen mit Duodenal-/Jejunalsonden liegen zur Zeit nicht vor
AVALOX 400 MG : Filmtabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja (zerfällt innert 15 min)	Ja (schlechter Geschmack)	--	Einnahme unabhängig von der Mahlzeit. Unzerkaut schlucken.
AVANDIA 4 MG : Filmtabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	kA	kA	--	Keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden!
BACTRIM FORTE : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	bitterer Geschmack! Alternative: Cotrim Sirup (im Sortiment)
BECOZYM FORTE : Dragees	Nein	Ja	Ja	--	Einnahme unzerkaut mit Flüssigkeit.
BELOC ZOK 25, 50, 100 MG : Retardtabletten	Ja	Ja	Nein	--	Tabletten mit Bruchrille (Mikropellets)
BENADON 300 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	
BENERVA 100 und 300 MG : Tabletten	Ja (keine Bruchrille)	Ja	Ja	--	Einnahme unzerkaut mit Flüssigkeit.
BEROCCA CALCIUM MAGNESIUM ZINK - Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
BETASERC 8 MG : Tabletten	Nein	Nein	Ja	--	Vorschlag: Betaserc Lösung
BETNESOL 0.5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Wasserlösliche Tablette; morgens mit oder nach dem Essen nehmen
BEXTRA 10 und 40 MG : Filmtabletten	Nein	kA	kA	--	
BRICANYL DURILES 7.5 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Unzerkaut schlucken.
BRUFEN 400 und 600 MG : Filmtabletten	Ja	kA	Nein	--	Zur Schonung der Magenschleimhaut nicht zerkaugen oder zerstückeln.
BRUFEN RETARD 800 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Brufen Sirup oder Granulat
BUSCOPAN 10 MG : Dragées	Nein (Dragées)	kA	Ja	--	Der Wirkstoff ist sehr bitter. Die Verabreichung per Sonde ist möglich.
CABASER 1 MG : Tabletten	Ja	kA	kA	--	Tabletten mit Bruchrille. Theoretisch kann die Tablette zermörserst und das Pulver in Wasser suspendiert werden. Es liegen jedoch keine Angaben über die Bioverfügbarkeit vor.
CAFERGOT : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten sind grundsätzlich teilbar und zermörserbar, wird aber nicht von der Firma empfohlen
CALCIMAGON D3 : Kautabletten	Nein	Ja, in Wasser	Ja	--	
CALCIUM ACETAT 500 MG : Salmon Pharma Tabletten	Nein	Ja, löslich	Ja	--	Wirkung mit Dünndarmsonde fraglich
CALCIUM-PHOSPHATBINDER 500 MG : Tabletten	Ja	Ja, suspendierbar	Ja	--	In Wasser suspendierbar Wirkung mit Dünndarmsonde fraglich
CALCIUM-SANDOZ D3 FF : Brausetabletten	Nein	Ja	Nein	--	In mind. 50 ml Wasser geben, gut spülen
CALCIUM-SANDOZ F 500 MG : Brausetabletten	Nein	Ja	Nein	--	In mind. 50 ml Wasser geben, gut spülen
CARVEDILOL SANDOZ 6.25 und 12.5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette in 10 ml Wasser zerfallen lassen oder zermörsern und in 10 ml Wasser suspendieren.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
CASODEX 50 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Casodex Tabletten können zerkleinert und mit Fruchtsaft oder Joghurt vermischt werden.
CATAPRESAN 150 MCG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Die zermörserten Tabletten können mit der Nahrung oder über die Sonde verabreicht werden.
CELEBREX 100 und 200 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Die Kapseln können geöffnet und der Inhalt (geschmackloses Pulver) in Flüssigkeit suspendiert eingenommen werden. Einnahme per Sonde möglich.
CELLCEPT 500 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Alternative: Cellcept Suspension (auf Rezept)
CEREPAR 75 MG : Suscaps	--	Nein	Nein	Nein	Der Inhalt der Cerepar Suscap ist halbfest und nicht wasserlöslich. Da die Kapsel nicht sauber entleert werden kann, wird vom Öffnen abgeraten.
CERUCAL RETARD 30 MG : Kapseln	kA	kA	Nein	--	Alternative: Primperan Trinklösung (Dosierungsintervall anpassen)
CETALLERG 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren.
CETIPRIN 200 MG : Tabletten	Ja	Nein	Nein	--	Zermörsern zerstört den Carrageenat-Mantel der Tablette, der die Speiseröhre vor Ulzerationen schützt.
CHININII SULFURICI ALBI 250 MG : Dragées	Nein	Nein	Nein	--	
CHLORALDURAT BLAU 250 MG : Kapseln (spätwirkend)	--	Nein	Nein	Nein	Retardierte, dünndarmlösliche Kapseln, die nicht geöffnet werden dürfen.
CHLORALDURAT ROT 250 MG : Kapseln (schnellwirkend)	--	Ja	--	Ja	Die Chloraldurat rot Kapseln enthalten eine Flüssigkeit, die suspendierbar ist.
CHLORAZIN 25 MG : Lacktabletten	Ja, halbierbar, aber nicht exakt viertelbar	Ja, suspendierbar	Ja	--	in Wasser suspendierbar, lichtempfindlich



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
CHLOROCHIN STREULI : Tabletten	Halbierbar, nicht exakt viertelbar	Ja	Ja	--	in Wasser suspendierbar, Wirkstoff leicht löslich in Wasser
CIPRALEX 10 MG : Filmtabletten	Ja	kA	Ja	--	
CIPROXIN 500 MG : Tabletten	Ja	Ja, suspendierbar	Ja	--	Die Tabletten zuerst gut zermörsern und dann mit Wasser aufschlännen. Alternative: Ciproxin Suspension (auf Rezept); 1 h vor oder 2 h nach dem Essen geben
CITALOPRAM ECOSOL 20 und 40 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren. Alternative: Seropram Tropfen (Rezept)
CITALOPRAM MEPHA 20 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren. Alternative: Seropram Tropfen (Rezept)
CLAMOXYL RC 750 MG : Tabletten	Ja	Ja, löslich	Ja	--	Zermörsern und Einnahme mit Wasser möglich. Nicht in Fruchtsaft oder Joghurt einnehmen (Säure). Die Tablette ist in Wasser löslich. Alternative: Clamoxyl Suspension
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 & 500 MG : Tabletten	Nein	Ja	Ja	--	
CLAROMYCIN 500 MG : Filmtabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja (in 10 min suspendierbar)	Ja	--	keine Bruchrille
CLOPIN ECO 25 und 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja (dauert 8 Minuten)	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren, gut nachspülen (zwei Mal)
CLOPIXOL 2 MG : Filmtablets	Nein	Ja	Ja	--	Alternative: Clopixol Tropfen (Rezept)
CO AMOXI MEPHA 375 und 1000 MG : Lactabs	Ja	Ja	Ja	--	Alternative: Co Amoxi oder Augmentin Suspension
CO DAFALGAN : Brausetabletten	Nein	Ja	--	--	



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
CO DIOVAN 80/12.5 MG, 160/12.5 MG: Filmtabletten	Ja (keine Bruchrille)	schwierig	Ja	--	schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich
CO-AMOXICILLIN SANDOZ 625 MG und 1G: dispergierbare Tabletten	Nein	Ja	--	--	Tabletten zum Trinken in ein halbes Glas Wasser geben, umrühren.
COAPROVEL : Tabletten	Nein	Ja	Ja	--	
COBANTRIL 250 MG : Kautabletten	kA	kA	kA	--	Vorschlag: Cobantril Suspension verwenden
CODIPRONT : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja, keine Sondengabe	Die Kapseln können geöffnet werden; der Inhalt darf nicht zerkleinert werden. Die Sonde verklebt leicht.
COLCHICIN 0.5 MG : Tabletten (KSA)	Ja	kA	Ja	--	Wirkstoff ist lichtempfindlich, sofort verabreichen
COMBIVIR : Tabletten	Keine Bruchrille	Kein Angaben	Ja (siehe Bemerkung)	--	Laut Firma: keine Angaben Alternativen: 3TC- und Retrovir-Lösung
COMTAN 200 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	kA	Ja (wird nicht empfohlen*)	--	*Die Substanz ist intensiv gelb gefärbt und kann Materialien gelb färben.
CONCOR 2.5 UND 5 MG: Lacktabletten	Ja (Bruchrille)	schwierig	Ja		schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich
CORDARONE 200 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Die Tabletten können pulverisiert und mit Wasser aufgeschlämmt werden, sofort verwenden
CO-RENITEN : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
COROTREND RETARD 20 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	kA	Unzerkaut schlucken. Kapseln können im Notfall zerbissen werden, wenn ein sofortiger Wirkungseintritt erwünscht ist. Der flüssige Kapselinhalt wird rasch resorbiert.
CORVATON FORTE 4 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
CORVATON RETARD 8 MG : Tabletten	Ja	Nein	Siehe Bemerkung	--	Da es sich um eine Matrix-Tablette handelt, geht die Retard-Wirkung beim Zermörsern nicht ganz verloren.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
COSAAR 50 und 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Verabreichung über Sonde: keine Daten
COSAAR PLUS : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja	Ja	--	Verabreichung über Sonde: keine Daten vorhanden.
CO-TRIMOXAZOL HELVEPHARM 960 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Nach dem Essen mit viel Flüssigkeit einnehmen
COVERSUM 4 und 8 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Verabreichung nach Zerkleinerung innert 1 h. Einnahme auch in Fruchtsäften oder Joghurt möglich.
COVERSUM COMBI : Tabletten	Keine Bruchrille	Ja	Ja	--	Verabreichung nach Zerkleinerung innert 1 h.
CREON 10'000 und 25'000 : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	enthalten säuregeschützte Pellets, die nicht zerkaut oder zermörsert werden dürfen. Sondengabe möglich: grosses Lumen, mit Flüssigkeit nachspülen.
CRESTOR : Filmtabletten	Keine Angaben	Ja	Keine Angaben	--	Tabletten in 5 ml Wasser lösen
CYKLOKAPRON 500 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja		besser Injektionslösung
CYNOMEL 0.025 MG : Tabletten	Ja (Kreuz-bruchrille)	kA	kA	--	
CYTOTEC 200 MCG : Tabletten	Ja (keine Bruchrille)	Ja	Ja	--	Keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden! Sofort verwenden!
DAFALGAN 1 G : Filmtabletten	kA	Möglich	Möglich	--	Viele Alternativen
DAFALGAN 500 MG : Tabletten	kA	Möglich	Möglich	--	Viele Alternativen
DAFALGAN 500 mg und 1 G : Brausetabletten	nein	Ja	Ja	--	
DAFALGAN ODIS 500 MG : Schmelztabletten	Nein	kA	kA	--	Schmilzt auf der Zunge.
DALACIN-C 300 MG : Kapseln	--	Ja	--	Ja	Bitterer Geschmack. Alternative: Dalacin C Granulat zur Herstellung einer Suspension (Rezept)
DALMADROM : Spalttabletten	Ja	Ja	Ja	--	Bitterer Geschmack



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
DANTAMACRIN 50 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	--	
DAPSON-FATOL TABLETTEN : 50 mg	Ja	Ja	Ja	--	
DARAPRIM 25 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
DEANXIT : Dragees	Keine Bruchrille	Ja	Ja	--	Beschleunigte Resorption nach Zermörsern, evtl. Dosis anpassen.
DEPAKINE 500 MG : Chrono Tabletten	Ja	Nein	Nein	--	Die Tabletten dürfen entlang der Bruchrille geteilt, aber nicht weiter zerkleinert werden. Vorschlag: Orfiril Sirup oder Orfiril Injektionslösung
DEROXAT 20 MG : Filmtabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	Mit dem Essen am Morgen geben. Kann mit dem Essen oder Trinken gemischt werden (bitterer Geschmack). Alternative: Deroxat Suspension
DETRUSITOL SR 4 MG : Retardkapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	Enthält retardierte Micropellets, die nicht zerkleinert werden dürfen.
DEXAMETHASON 1 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
DEXAMETHASON 4 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten mit Kreuzbruchrille
DIAMICRON 80 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Sondengabe: fein zermörsern und in Wasser suspendieren
DIAMICRON MR 30 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Nein	Nein	--	
DIAMOX 250 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	
DIFLUCAN 50, 150, 200 MG : Kapseln	--	suspendierbar	Nein	Ja	Alternative: Diflucan Suspension
DIGOXIN 0.125 und 0.25 MG: Tabletten	Ja*	Ja	Ja	--	*Resorption kann beschleunigt sein, Alternative: Ampullen
DIHYDROCODEINON 5 MG : Tabletten	Ja	Ja, suspendierbar	Ja	--	
DILATREND 6.25, 12.5, 25 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Die Tabletten können in Wasser suspendiert werden. Lichtempfindlicher Wirkstoff → sofort applizieren



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
DIMAVAL 100 MG : Kapseln	--	Ja	Nein	Ja	kann als Suspension gegeben werden
DIOVAN 40, 80, 160 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	schwierig	Ja	--	Schwer suspendierbar, Sonde kann verstopfen!
DIPIPERON 40 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
DISTRANEURIN 300 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	Vorschlag: Distraneurin Mixtur (Rezept), kann mit Wasser oder Saft verdünnt werden. Einnahme innert 30 Minuten.
DITROPAN 5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
DORMICUM 7.5 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Dormicum Ampullen können auch oral eingenommen werden. Wegen des bitteren Geschmacks in Sirup verdünnen.
DOSTINEX 0.5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden
ECODOLOR RET 100 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	
ECOPROFEN 400 MG : Filmtabletten	Ja	Ja, innert 5-8 min			Sondenapplikation: Tablette erst mörsern, dann suspendieren
EFEXOR 37.5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Fünfeckige Tablette, keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden
EFEXOR ER 75 und 150 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Efexor ER Kapseln enthalten Mikropellets, die nicht zerkleinert werden dürfen. Der Kapselinhalt kann aber in einer kalten Flüssigkeit oder Joghurt etc. eingenommen werden. Sondenapplikation: Efexor Tabletten
EFFORTIL DEPOT 25 MG : Perlongetten	--	Nein	Nein	Ja	Der Kapselinhalt muss intakt bleiben, kann aber mit Nahrung vermischt werden. Nicht suspendieren! Alternative: Effortil Tropfen oder Injekt.
ELTROXIN 0.05 und 0.1 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten können pulverisiert und dann suspendiert werden.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
EMEND : Kapseln	--	Ja	Nein	Ja	Inhalt (Pellets) nicht zerkleinern
EMSELEX 7.5 und 15 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Verlust der Retardwirkung
ENDOXAN 50 MG : Dragees	Nein (Dragees)	Ja	Ja	--	
ENTUMIN 40 MG : Tabletten [30]	Ja	kA	Ja	--	Bruchrille auf einer Tablettenseite
ERYTHROCIN ES 500 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Tabletten sind mit einem säureresistenten Mantel überzogen. Vorschlag: Erythrocin Sirup verwenden
EXELON 1.5, 3, 4.5, 6 MG : Kapseln	Nein	kA	kA	kA	Vorschlag: Exelon Lösung verwenden (im Sortiment)
FAMVIR 250 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	möglich	--	Unzerkaut mit Wasser schlucken
FANSIMEF : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Das Teilen und Mörsern sollte möglich sein, es liegen jedoch keine Erfahrungswerte vor.
FARLUTAL 500 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Alternative: Trinkampullen verwenden
FELDEN LINGUAL 20 MG : Tabletten	Nein	Ja	--	--	Vorschlag: Felden Tabs verwenden (sind gut wasserlöslich)
FELODIL : Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	--	Nicht teilen, nicht zerdrücken, nicht zerkauen, Retardtablette!
FENISTIL 4 MG : Retardkapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	Retardprinzip geht verloren. Vorschlag: Fenistil Tropfen
FERRUM HAUSMANN 100 MG : Kapseln	--	Nicht auflösen, nur aufschlännen	Nein	Ja	enthalten magensaftresistente Pellets, die nicht zerkleinert oder aufgelöst werden dürfen. Alternative: Maltofer Sirup oder Tropfen verwenden.
FLAMON 40 MG : Lactabs	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja (grosse Rückstände)	Ja	--	Unzerkaut zum oder kurz nach dem Essen einnehmen. Sondengabe: zermörsern und in 30 ml Wasser suspendieren.
FLATULEX : Kautabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten zerfallen im Wasser, möglichst rasch verabreichen,



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					schlechter Geschmack; Alternative: Flatulex Tropfen
FLORINEF 0.1 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
FLOROSAN : Kapseln	Nein	Ja, in Wasser oder Sonden-nahrung	--	Ja	Applikation unabhängig von Sondenlage möglich; Kapselinhalt kann mit der Sondennahrung vermischt werden, sofort anwenden!
FLOXAPEN 500 MG : Kapseln	--	Nein	--	Ja	Nicht in Fruchtsaft oder Joghurt einnehmen (Säure); nüchtern einnehmen
FLUANXOL 5 MG : Dragees	Nein	Ja	Ja	--	
FLUCONAZOL SANDOZ 50 und 150 MG : Kapseln	Nein	Ja	--	Ja	Mit Nahrung einnehmen
FLUOXETIN-MEPHA 20 MG : Kapseln	Nein	suspendierbar	--	Ja	Sondenapplikation als Suspension
FOLVITE 1 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Die Tabletten können gut in Wasser aufgelöst werden.
FOSAMAX 70 MG : Wochentabletten	Nein	Nein	Nein	Nein	Vorschlag: anderes Biphosphonat i.v. verwenden
FROBEN RETARD 200 MG : Retardkapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	Unzerkaut mit Flüssigkeit schlucken
FUROSPIR : Lactabs	Ja (mit Tablettenteiler)	Nein	Ja	--	Sondengabe: zermörsern und in 40 ml Wasser suspendieren.
FURSOL 40 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Tabletten nüchtern unzerkaut mit viel Flüssigkeit nehmen. Sondengabe: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser aufschlämmen, sofort anwenden
GABANTIN 100 und 300 MG: Kapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	Suspension ist sondengängig.
GABANTIN 800 MG: Filmtabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja (30 min)	Ja		Suspension ist sondengängig.
GABAPENTIN SANDOZ 100 und 300 MG : Kapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
GLAUPAX 250 MG : Tabletten	Ja (Kreuzkerbe)	Ja, in Wasser suspendierbar	Ja	--	
GLIMEPIRID SANDOZ 2 und 3 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
GLIVEC 100 MG : Filmtabletten	Ja (Bruchrille)	ja	Nein	--	Achtung Zytostatikum! Eine Zerkleinerung sollte aus Sicherheitsgründen nicht erfolgen. 100 mg in ca. 50 ml Wasser suspendieren, sofort geben!
GLIVEC 400 MG : Filmtabletten	Ja (keine Bruchrille)	Ja	Nein	--	Achtung Zytostatikum! Die Tabletten weisen keine Bruchrille auf. Da sie aber suspendierbar sind, sind sie theoretisch auch teilbar. Eine Dosis von 400 mg in ca. 200 ml suspendieren und sofort einnehmen.
GLUCOPHAGE 500 und 850 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Der Wirkstoff weist einen unangenehmen metallischen Geschmack auf. Einnahme als Suspension in Wasser oder unter Zusatz von Sirup.
GLUTRIL 25 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
GUTRON 2.5 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
GYNIPRAL 0.5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Die Tabletten haben keine Bruchrille.
HALCION 0.25 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
HALDOL 1 und 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Möglich, jedoch besser Tropfen benutzen, da Pulver verklebt und dadurch die Sonde verstopft.
HYDROCORTONE 10 MG : Tabletten	Nein	Ja	Ja	--	
HYGROTON 50 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
IMODIUM : Kapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	Die Kapseln können geöffnet und der Inhalt suspendiert werden, verklebt



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					jedoch leicht. Alternative: Imodium Sirup oder Imodium lingual verwenden.
IMODIUM LINGUAL 2 MG	Nein	Ja	Nein	--	Sondenapplikation nicht möglich => Imodium Sirup verwenden
IMUREK 50 MG : Filmtabletten	Nein	Nein	Im Notfall	--	Lichtschutz! Kontakt mit der Haut vermeiden (Immunsuppressivum)!
INDERAL40 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
INDOCID 25 MG : Kapseln	--	Nein, Inhalt aufschlammbar	Nein	Ja	Die Kapseln dürfen geöffnet werden; die darin enthaltenen Pellets müssen intakt bleiben; zum Essen geben
INFLAMAC 75 SR : Kapseln	Nein	Ja	Jein	Ja	Kapselinhalt suspendieren, aber nicht zermörsern (Retardpellets); zum Essen einnehmen
IRFEN 400 MG : Lactabs	Nein	Nein	Ja	--	Sondengabe: zermörsern und in 40 ml Wasser suspendieren (Überzug splittet)
IRFEN 600 MG : Lactabs	Ja (Bruchrille)	Nein	Ja	--	Sondengabe: zermörsern und in 40 ml Wasser suspendieren (Überzug splittet)
IRFEN 800 MG RETARD : Retardtabletten	kA	Ja (grosse Rückstände)	kA	--	Unzerkaut schlucken, kann in Wasser aufgeschlämmt eingenommen werden. Sondengabe: Irfen Lactabs verwenden.
ISOKET RETARD 120 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Ja	Der Kapselinhalt ist sondengängig.
ISOKET RETARD 40 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	
ISOPTIN 80 MG : Filmtabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Alginhydrokolloid-Matrix; die Hilfsstoffe lösen sich nicht auf.
ISOPTIN RETARD 120 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Isoptin Filmtabletten, Isoptin Injektionslösung.
ISOPTIN RR 240 MG : Filmtabs	Ja (Bruchrille)	Nein, Retardform	Nein, Retardform	--	Vorschlag: Isoptin Filmtabletten, Isoptin Injektionslösung.
ISOZID 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	
JARSIN : Dragees	Nein	Ja	Ja	--	lichtempfindlich



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
KALETRA : Filmtabletten	Keine Bruchrille	kA	Nein	--	Alternative: Kaletra Sirup (kein Lagerartikel => Rezept)
KALIUM EFFERVETTEN : Brausetabletten	Nein	Ja	Ja	--	
KAPANOL 20 und 50 MG : Retardkapseln	--	Nein	Nein	Ja	Kapselinhalt in Joghurt, Apfelmus oder Marmelade einrühren oder in 30 ml Wasser aufschwemmen und sofort einnehmen. Die in den Kapseln enthaltenen Pellets dürfen nicht gekaut, zerdrückt oder aufgelöst werden. Um sicher zu sein, dass alle Pellets geschluckt wurden, Mund und Glas mit Wasser nachspülen.
KCL RETARD 10 MMOL : Dragées	Nein	Nein	Nein	--	Der Tablettenkörper erscheint nach Abgabe des Wirkstoffes intakt in den Faeces.
KEPPRA 500 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja		Bitterer Geschmack
KLACID 250 MG : Filmtabletten	Nein	Schwierig	Ja	--	Schwierig suspendierbar, kann die Sonde verstopfen. Alternative: Klaciped Suspension
LAMICTAL 50 MG : Tabletten	Keine Bruchrille	Ja	möglich		Kann suspendiert und gekaut werden.
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 MG : Tabletten	Ja	Ja, inert Minuten	Ja	--	Sondenapplikation: in 10 ml Wasser suspendieren, Mörsern nicht unbedingt erforderlich, gut nachspülen
LARIAM 250 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Das Teilen und Mörsern sollte möglich sein, es liegen jedoch keine Erfahrungswerte vor.
LASIX 40 MG : Tabletten	Ja	Wahrscheinlich suspendierbar	Ja	--	Vorschlag: Lasix Ampullen können peroral verabreicht werden, die Lösung hat aber einen seifigen Geschmack.
LASIX 500 MG : Tabletten	Ja	Wahrscheinlich suspendierbar	Ja	--	Vorschlag: Lasix Ampullen (seifiger Geschmack)



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
LEPONEX 25 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	
LEUCOVORIN 15 MG : Tabletten	Nein	Nein	Möglich	--	Hautkontakt vermeiden, besser Injektionslösung
LEXOTANIL 1.5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Die Tabletten können pulverisiert und suspendiert werden.
LEXOTANIL 3 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	s.o.
LIORESAL 10 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	Mit dem Essen geben
LISITRIL 5, 10 und 20 MG : Tabletten	Ja	Ja (innert 5-15 min in 30 ml Wasser)	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren, gut ausspülen
LISOPRIL : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja (5 min)	Ja	--	
LISOPRIL PLUS : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja (10 min)	Ja	--	
LITALIR 500 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Nur im Notfall	Zytostatikum! Schutzmassnahmen!
LITHIOFOR 660 MG : Retardtabletten	Ja	Nein	Nein	--	Die Matrixtablette kann entlang der Bruchkerbe geteilt, darf aber nicht weiter zerkleinert werden.
LOFTYL 300 MG : Filmtabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	kA	Theoretisch möglich	--	
LONITEN 2.5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	schnellere Resorption möglich
LOPIRIN 12.5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
LUDIOMIL 25 MG : Dragees	Ja, jedoch schwierig bei Dragées	kA	Ja (siehe Bemerkung)	--	schnellere Resorption möglich
LUMINAL 100 MG : Tabletten	Ja	kA	Nein	--	
LYRICA 25, 75, 150 MG: Kapseln	--	Ja	--	Ja	Sondenapplikation möglich, Löslichkeit in Wasser: 32mg /ml, sofort verabreichen
LYSOPAIN : Lutschtabletten	Nein	--	--	--	



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
MADOPAR 125 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Die Tabletten weisen eine Kreuzbruchrille auf, instabiler Wirkstoff. Vorschlag: Madopar LIQ (= wasserlösliche Tabletten) verwenden.
MADOPAR 62.5 MG : Kapseln	--	Ja (Sofort anwenden!)	Nein	Ja	Die Kapseln dürfen erst unmittelbar vor der Verabreichung geöffnet werden, weil der Wirkstoff sehr instabil ist.
MADOPAR DR 250 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Nein	Nein	--	Teilbar entlang der Bruchkerbe, aber nicht weiter zerkleinern. Vorschlag: Madopar LIQ (= wasserlösliche Tabletten) verwenden.
MADOPAR LIQ 62.5 und 125 MG : Tabletten	Nein	Ja	--	--	
MALARONE 100 MG : Tabletten	Nein	Ja	Ja	--	
MALIASIN 100 MG : Dragees	Ja (schwierig bei Dragees)	Ja	Ja	--	Unzerkaut mit genügend Flüssigkeit vor einer Mahlzeit einnehmen
MALTOFER FOL : Kautabletten	Ja	Ja	Ja	--	
MARCOUMAR 3 MG : Tabletten	Ja	Suspendierbar	Ja	--	Resorption ist verändert → Quick kontrollieren Alternative: evtl. Heparin i.v.
MEDROL 32 und 100 MG : Tabletten	Ja (mit Teiler)*	kA	Ja	--	*Laut Kompendium und Firma eignen sich die Tabletten (trotz Bruchrille) nicht zum Teilen => Tablettenteiler verwenden
MELIX 5 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
MEPHADOLOR 250 MG : Kapseln	Nein	Ja	kA	Ja	Alternative: Suppositorien (Ponstan)
MEPHADOLOR NEO 500 MG : Filmtabletten	Ja	Ja	Ja	--	
MEPHANOL 100 MG und 300 : Tabletten	Ja	Ja	kA	--	Tabletten mit Bruchrille. Die Tabletten können in ca. 50 ml Leitungswasser suspendiert (Zerfall innerhalb einer Minute) und sofort verabreicht werden.
METHADON 5 MG : Tabletten	Ja	Ja (suspend.)	Ja	--	Alternative: Methadontropfen



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
METHERGIN 0.125 MG : Dragees	Nein	Nein	Ja (siehe Bemerkung)	--	Zerkleinerung hat einen Wirkungsverlust zur Folge. Vorschlag: Methergin Tropflösung (auf Rezept)
METO ZEROK 25, 50 und 100 MG : Retardtabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Nein	--	Tabletten in genügend Wasser zerfallen lassen, nicht zerdrücken oder zerkauen Sondenapplikation: Spritze mit breitem Konus verwenden, Sondendurchmesser mind. 14 CH.
METOLAZON 5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
MIANSERIN : Tabletten Lactabs	Ja (Bruchrille)	suspendierbar	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette zermörsern und in 40 ml Wasser suspendieren.
MICARDIS PLUS 80 / 12.5 MG : Tabletten	Nein	kA	Nein	--	Tablette ist sehr hygroskopisch
MILGAMMA 100 : Dragees	Nein	Ja	Ja	--	sondengängig nach guter Zerkleinerung
MILLICORTEN 1 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
MIMPARA 30 MG : Tabletten	Keine Bruchrille	kA	Nein	--	Filmtabletten
MOGADON 5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	
MOTILIUM 10 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Vorschlag: Motilium Suspension für die Sondengabe verwenden; mind. 30 min vor dem Essen geben
MOTILIUM LINGUAL 10 MG: Tabletten	Nein	Ja (nicht über Sonde geben)	Nein	--	Sollte nicht über Sonde verabreicht werden, mindestens 30 min vor dem Essen geben
MST 10 CONTINUS : Retardtabletten MST-30 CONTINUS : Retardtabletten MST-60 CONTINUS : Retardtabletten MST-100 CONTINUS : Retardtabletten MST-200 CONTINUS : Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: a) MST Suspension ret. (nach Zubereitung sofort einnehmen; der Sachetinhalt kann auch auf weiche, kalte Nahrung aufgestreut werden, ebenfalls sofort einnehmen) b) MST Continus Supp. retard c) Die Tabletten können auch rektal



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					verabreicht werden, jedoch kann die Bioverfügbarkeit und Kinetik ändern.
MYAMBUTOL 400 MG : Filmtabletten	Ja	Nein	Ja	--	
MYCOBUTIN 150 MG : Kapseln	Nein	Ja	Ja	Ja	
MYRTAVEN : Kapseln	Nein	Theoretisch möglich, aber stark färbend	--	Theoretisch möglich, aber stark färbend	Kapselinhalt enthält stark färbende Farbstoffe, daher ist ein Öffnen der Kapseln nicht empfehlenswert.
NATULAN 50 MG : Kapseln	--	Ja	Nein	Ja	Kapselinhalt in reichlich Wasser dispergieren. Zytostatikum!
NAVELBINE 20 und 30 MG Weichkapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	beschädigte Kapseln nicht schlucken! Alternative: i.v. Applikation
NAVOBAN 5 MG : Kapseln	--	kA	kA	Ja	Kapseln können geöffnet und der Inhalt verabreicht werden. Alternative: Notwendige Teilmenge einer Ampulle mit Orangensaft oder Cola mischen und sofort verabreichen.
NEBILET 5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tablette kann zerkleinert werden und über eine Sonde verabreicht werden.
NEOBRON : Filmtabletten	Nein	Nein	Nein	--	
NEO-MERCAZOLE 5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
NEOMYCIN 250 MG : Tabletten	kA	kA	kA	--	Vorschlag: Neomycin 500 mg Trockensubstanz (Ampulle) verwenden.
NEPHROTRANS 500 MG: Kapseln	Nein	--	--	Nein	Kapseln dürfen nicht geöffnet werden (magensaftresistenter Überzug)
NEURONTIN 100 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Der Inhalt der Kapseln kann mit verschiedenen Nahrungsmitteln (Apfelsaft, Orangensaft, Schokoladenpudding) vermischt werden.
NEURONTIN 300 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Der Inhalt der Kapseln kann mit verschiedenen Nahrungsmitteln



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					(Apfelsaft, Orangensaft, Schokoladenpudding) vermischt werden.
NEURONTIN 800 MG : Filmtabletten	kA	Nein	Ja	--	Nach dem Essen geben (Interaktion mit Aluminium und Magnesium)
NIFEDIPIN MEPHA 20 MG : Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	--	Keine Sondenapplikation möglich, lichtempfindlich
NISULID 100 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	kA	Ja	--	Vorschlag: Nisulid Granulat
NITROGLYCERIN 0.8 MG : Kaukapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	Kapsel mit den Schneidezähnen aufbeissen, zerkauen, damit die Lösung sich mit dem Speichel vermischen kann. Für Patienten mit Zahnprothesen empfiehlt es sich, die Kapseln vor dem Aufbeissen kurze Zeit im Mund zu behalten. Die leere Kapsel kann ausgespuckt werden.
NIVAQUINE 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
NOLVADEX 20 MG : Tabletten	Ja, Tablette hat keine Bruchrille	Ja	Ja	--	Kann in Wasser, Fruchtsäften oder Yoghurt eingenommen werden.
NOFIL FORTE : Tabletten	Ja	kA	kA	--	Vorschlag: Nofil oder Cotrim Sirup
NORFLOXACIN-MEPHA 400 MG : Lactabs	Ja (Bruchrille)	Ja (schwierig, Rückstände)	Ja	--	Nüchtern einnehmen! 1 h vor oder 2 h nach dem Essen. Sondengabe: Tabletten mörsern und in 40 ml Wasser suspendieren.
NOROXIN 400 MG : Tabletten	Nein	Ja, suspendierbar	Ja	--	1 h vor oder 2 h nach dem Essen nehmen.
NORSOL 400 MG : Filmtabletten	Nein	Nein	Ja	--	Tablette gut mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren; 1h vor oder 2h nach dem Essen einnehmen
NORVASC 5 und 10 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Suspendierbar, Schlecht löslich	Ja	--	Schlecht löslich, daher mit reichlich Flüssigkeit nachspülen.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
NORVIR 100 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	Keine Sondenapplikation, da Weichgelatine-kapseln; Alternative: Norvir-Sirup (600 mg/7.5 ml)
NOVADRAL RETARD 15 MG : Dragees	Nein	kA	Nein	--	Vorschlag: ev. Effortil Tropfen
NOVALGIN 500 MG : Tabletten	Kein Bruchrille	Ja	Ja		Vorschlag: Novalgin Tropfen
NOZINAN 25 und 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille; Alternative: Nozinan Tropfen (Rezept)
OLFEN : Lactabs	Nein	Nein	Ja	--	Sondengabe: zermörsern und in 30 ml Wasser suspendieren; Alternativen: Olfen dispersible, Voltaren Tropfen, Suppositorien oder Ampullen
OMEPRAZOL SANDOZ ECO 20 MG: Kapseln	Nein	schwierig	Nein	Ja	Kapselinhalt kann mit leicht sauren Getränken (z. B. Säfte, Joghurt, Sauermilch) vermischt werden. Kapselinhalt darf weder zerkaut noch zerdrückt werden (magensaftresistente Pellets). Sondenapplikation nicht empfehlenswert
ORFIRIL LONG 500 und 1000 MG : Mlnipacks	--	Ja	Nein	Ja	Inhalt suspendierbar, aber nicht zerkleinern! Verklebt leicht, daher nur grosslumige Sonden verwenden (CH > 8)! Vorschlag: Orfiril Sirup
ORFIRIL LONG 150 und 300 MG : Retardkapseln	Nein	Ja	Nein	Ja	Kapselinhalt suspendierbar, aber nicht zerkleinern! Verklebt leicht, daher nur grosslumige Sonden verwenden (CH > 8)! Vorschlag: Orfiril Sirup
OSPEN 1000 (1 MIO I.E.) : Tabletten	Ja	(Ja)*	Nein	--	* Tabletten lösen sich sehr langsam auf (ca. 60 min), Tabletten besser mörsern und in 20 ml Wasser suspendieren; Gabe über Sonde unabhängig von der Sondenlage möglich



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					(Sondendurchmesser mind. 6 CH)
OSSOPAN 200 MG : Dragees	kA	Ja	Ja	--	Nach Zerkleinerung mittels Mörser in Wasser suspendieren.
OXYCONTIN 5, 10, 20 MG : Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Oxnorm Tropfen (Dosierung anpassen: alle 4-6 Stunden geben)
PACEUM 2 MG (DIAZEPAM) : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille
PALLADON 1.3 und 2.6 MG : Kapseln	Nein	Ja	--	Ja	
PALLADON RETARD 4 und 8 MG : Retard-Kapseln	Ja	Schwer suspendierbar	Nein	Ja	Granula dürfen nicht zerkleinert werden! Sondenapplikation wird in der Praxis durchgeführt.
PANADOL 500 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Filmtabletten werden vorzugsweise zuerst zermörstert und anschliessend in lauwarmem Wasser suspendiert.
PANTOZOL 20 und 40 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein (ausser bei Jejenualsonden)	--	Alternative: Antra MUPS Tabletten (Antra: Die Tabletten dürfen weder halbiert noch zerkleinert, können aber in Wasser suspendiert werden: Einnahme per Sonde: Tablette in eine Spritze transferieren, Kolben wieder aufsetzen, Flüssigkeit aufziehen, ca. 1 Min. schütteln bis Tablette zerfallen ist und die Reste des Schutzüberzuges aufgelöst sind. Dann sofort, bevor eine Sedimentation eintreten kann, via Sonde verabreichen.)
PARLODEL 2.5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	
PARLODEL 5 MG : Kapseln	Nein	Ja	--	Ja	
PASPERTIN RETARD : Kapseln	--	kA	Nein	Ja	Vorschlag: Paspertin Tropfen oder Suppositorien verwenden.
PENICILLIN 1 MIO. U.I. : Filmtabletten	Ja	Nein (harter Kern)	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille. Die Tabletten müssen erst fein zermörstert und dann



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					mit Wasser suspendiert werden.
PENTASA 500 MG : Depot-Tabletten	Ja	Ja	Nein	--	Suspendieren ist besonders geeignet.
PERENTEROL 250 MG : Kapseln	--	Ja	--	Ja	Alternative: Perenterol Beutel
PHENHYDAN 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Sondengabe: Tabletten in etwas Wasser zerfallen lassen. Erhöhte Resorption bei nüchterner Gabe → Blutspiegelkontrolle!
PHENOBARBITAL 100 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten mit Kreuzbruchrille
PHENYTOIN GEROT 100 MG : Tabletten	kA	Ja	Ja	--	Erhöhte Resorption bei nüchterner Gabe → Blutspiegelkontrolle!
PHOSPHONORM 300 MG : Kapseln	Ja	Ja	Ja	Ja	
PHYSIOTENS 0.2 und 0.4 MG: Filmtabletten	Keine Bruchrille	Ja	Ja	--	
PK-MERZ 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
PLAVIX 75 MG : Tabletten	Keine Bruchrille	Ja	Ja (siehe Bemerkung)	--	Lichtempfindlicher Wirkstoff, bitter. Nach Zubereitung sofort verwenden!
PLENDIL 5 MG : Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	--	
PODOMEXEF 100 MG : Filmtabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja, in Wasser	kA	--	Alternative: Podomexef Granulat für orale Suspension
PRADIF T 400 MCG : Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	--	Kapsel enthält retardierte Pellets, die nicht zerkleinert werden dürfen. Sondengabe: nur grosse Lumen (CH > 12), mit Wasser nachspülen (klebt!)
PRAVASTATIN SANDOZ 20 und 40 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	sondengängig
PRAZINE 25 und 50 MG : Dragees	Nein	Nein	Nein*	--	Resorption verändert sich Alternative: Nozinan Tropfen (Rezept)
PREDNISOLON STREULI : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Lichtschutz! Alternative: Prednisolon-P Streuli Tropfen; am Morgen geben!
PREDNISON 5, 20, 50 MG (GALEPHARM) : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Lichtschutz! am Morgen geben!



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
PRIMPERAN 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Alternative: Primperan Trinklösung 30 min. vor dem Essen einnehmen
PRINIL MEPHA : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
PRINZIDE MEPHA : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
PROBENECID 500 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Tabletten unzerkaut einnehmen (schlechter Geschmack).
PROLIPASE : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Die Kapseln können geöffnet werden, Kapselinhalt (Pellets) nicht zerkleinern.
PYRAZINAMID 500 MG: Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
RANITIDIN MEPHA 150 : Lactabs	Ja (mit Tablettenteiler)	Nein	Ja	--	Sondengabe: Tablette gut zermörsern und in 40 ml Wasser suspendieren.
RANITIDIN MEPHA 300 : Lactabs	Ja (Bruchrille)	Nein	Ja	--	s.o.
REMERON 30 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Alternative: Remeron SolTab (Schmelztabletten), die sich auf der Zunge auflösen und sich bei Patienten mit Schluckbeschwerden eignen.
REMERON SOLTAB 15 MG : Schmelztab	Nein	Ja	kA	--	s.o.
REMINYL PR 8, 16, 24 MG : Kapseln	Nein	kA	Nein	Ja	Auf Sondengabe verzichten. Kapselinhalt kann in Flüssigkeit oder Joghurt gegeben werden
RENAGEL 800 MG : Filmtabletten	Nein	Nicht empfehlenswert, aber möglich	Nicht empfehlenswert, aber möglich	--	
RENITEN 20 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille
RENITEN MITE 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille
RENITEN PLUS : Tabletten	Ja	kA	Nein	--	Tabletten ohne Bruchrille
RENITEN SUBMITE 5 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille
RESONIUM A : Pulver 450g (Natriumbeladener Kationenaustauscher)	--	Suspendierbar	--	--	ca. 15 g Pulver mit Wasser oder 70 %- iger Sorbitlösung aufschlämmen und durch Sonde geben



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
RETROVIR AZT 250 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	Möglich, nicht empfehlenswert	Hautkontakt vermeiden (HIV-Mittel), Sondenapplikation möglich
REYATAZ 150 MG: Kapseln	--	kA	Nein	Ja (nicht zu empfehlen)	Kapseln sind schwer zu öffnen
RHEFLUIN FORTE : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
RHINOPRONT : Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Die Kapseln können geöffnet werden; die darin enthaltenen Pellets müssen jedoch intakt bleiben. Vorschlag: Rhinoprone Sirup verwenden.
RIAMET : Tabletten	Ja	kA	kA	--	
RICAL Kapseln	--	Nein	Nein	Ja	Applikation per Sonde wird nicht empfohlen,
RIFAMPICINE 300 MG : Kapseln	--	(Ja)	Nein	Ja	Kapselinhalt kann suspendiert werden. Jedoch stark rote Färbung (Verfärbung der Sonde) und bitterer Geschmack ! 1-2 h vor dem Essen geben!
RIFATER : Dragees	Nein	Ja	Ja	--	
RIMACTAN 150 und 300 MG : Kapseln	--	(Ja)	Nein	Ja	Kapselinhalt kann suspendiert werden. Jedoch stark rote Färbung (Verfärbung der Sonde) und bitterer Geschmack ! 1-2 h vor dem Essen geben!
RIMIFON 150 MG : Tabletten	Nein	Ja	Ja	--	bitterer Geschmack; 1-2 h vor dem Essen geben!
RISPERDAL 0.5, 1, 2 MG : Filmtabletten	Ja	kA	Ja	--	Pulvermischung verklebt leicht, Alternative: Risperdal Lösung
RITALIN 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
RITALIN SR 20 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Die Tabletten müssen ganz geschluckt werden. Die Retardwirkung wird durch das Teilen verringert und geht beim Zermörsern völlig verloren.
RIVOTRIL 0.5 und 2 MG : Tabletten	Ja (viertelbar)	Ja	Ja	--	Alternative: Rivotril Tropfen



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
ROCALTROL 0.25 MCG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	Weichgelatine kapseln mit öliger Lösung; Vorschlag: Rocaltrol Tropfen
ROHYPNOL 1 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten sehr fein mörsern und mit fetthaltigen Flüssigkeiten wie Milch vermischen oder in ein Joghurt einrühren.
ROVAMYCINE 3 MIO. U.I. : Tabletten	Ja (keine Bruchrille)	kA	Ja	--	
RULID 300 MG : Tabletten	Theoretisch ja	Ja	Ja	--	
SALOFALK 500 MG: Tabletten		Schwierig	Nein, ausser bei Duodenal-, Jejenal-Sonde		Magensaftresistenter Film wird beim Zerkleinern zerstört, schwer suspendierbar; Vorschlag: Supp. oder Klistier, Asacol Klysm
SANDIMMUN NEORAL 50 und 100 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Trinklösung
SANTURIL 500 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja	--	
SAROTEN RETARD 25, 50 MG : Kapseln	Nein	suspendierbar	Nein	Ja	Die Kapseln dürfen geöffnet werden, aber die enthaltenen Pellets müssen intakt bleiben.
SELIPRAN 20 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
SELIPRAN 40 MG : Tabletten	Ja (nur mit Tablettenteiler)	Ja	Ja	--	Keine Bruchrille
SERESTA EXPIDET 15 MG : Tabletten	Nein	Ja , gut löslich	--	--	In 5 ml Wasser lösen
SEROPRAM 20 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Alternative: Seropram Tropfen
SEROQUEL 25, 100, 200 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Nicht löslich, schwierig zu suspendieren	Ja	--	Sondenapplikation nicht möglich. Die zermörserte Tablette löst sich nicht in Wasser auf. Es ist deshalb darauf zu achten, dass sie gut aufgeschwemmt wird und der ganze Rückstand eingenommen wird, bitterer Geschmack
SEVRE LONG 200 MG : Retardkapseln	Ja	Nein	Nein, Granula	Ja	Kapselinhalt nicht zermörsern oder



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
			nicht zerkleinern		kauen; Sondenapplikation möglich (auf grossen Sondendurchmesser achten)
SEVREDOL 20 MG : Tabletten	Ja, Bruchrille	kA	kA	--	
SIBELIUM 5 MG : Kapseln	Nein	Ja	--	--	Nicht mit Nahrung einnehmen
SIFROL 0.125 UND 0.25 MG: Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	kA	Ja	--	
SINTROM 1 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	veränderte Resorption → Quick/INR kontrollieren
SIRDALUD 2 und 4 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	
SIRDALUD MR RETARD 6 MG : Kapseln	--	Ja	Nein	Ja	Enthalten retardierte Pellets, die nicht zerstört werden dürfen. Inhalt darf in Wasser suspendiert werden.
SOMNIUM : Tabletten	Ja	kA	kA	--	Tabletten mit Bruchrille
SORTIS 10, 20, 40 MG : Tabletten	Nein	Ja	Ja (siehe Bemerkung)	--	Zermörserbar, aber der Filmüberzug löst sich ab → Dosierung wird ungenau
SOTALEX 80 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja, gut löslich	Ja	--	Tabletten sind gut wasserlöslich, Lösung sofort verwenden
SPASMO-CANULASE : Bitabs	kA	Nein (ausser bei Duodenal-/Jejunalsonde)	Nein (ausser bei Duodenal-/Jejunalsonde)	--	Magensaftresistenter Film wird zerstört; unzerkaut schlucken
SPASMO-URGENIN NEO : Dragées	Nein	Ja	Ja	--	Einnahme als Suspension in Wasser oder gemischt unter wenig breiige Nahrung.
STALEVO 265.5 MG (50/12.5/200 MG) : Tabl.	Ja	kA	Ja	--	
STALEVO 325MG (100/25/200 MG) : Tabl.	Ja	kA	Ja	--	
STALEVO 387.5 MG (150/37.5/200 MG) : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
STILNOX 10 MG : Filmtabletten	Ja (Bruchrille)	Nein	Ja	--	sehr bittere und lichtempfindliche Wirkstoffe
STOCRIN 200 MG : Kapseln	Nein	Suspendierbar,	Nein	Ja	Sondengabe: Die Substanz ist nur



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
		Wirkstoff ist unlöslich in Wasser			schwer suspendierbar, so dass die Sonde leicht verstopfen kann. Vorschlag: Stocrin Lösung oder in Lipiden lösen
SULFADIAZIN : Tabletten	Ja	Ja, in Wasser suspendierbar	Ja	--	
SUPRACYCLIN 100 MG : Tabs	Nein	Ja	kA	--	Entweder unzerkaut mit viel Flüssigkeit oder in einem Glas Wasser suspendiert einnehmen; Einnahme mit Nahrung erhöht die Magenverträglichkeit.
SYMMETREL 100 MG : Kapseln	--	Nein	Siehe unter Bemerkungen	Nein, siehe Bemerkungen	Es handelt sich um Weichgelatine kapseln, die aufgeschnitten und ausgespült werden müssten, um den Inhalt zu entnehmen.
TAMBOCOR 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Nicht auflösbar, aber suspendierbar	Ja	--	
TAMEC 20 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
TAMIFLU : Kapseln	--	Ja (in Wasser)	--	Ja	
TARIVID 200 MG : Filmtabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Tabletten mit Bruchrille
TAVANIC 500 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Suspendierbar, Wirkstoff schlecht löslich	Ja	--	Filmtablette mit Bruchrille. Die Filmtabletten können zermörsert und als Suspension über eine Magensonde gegeben werden. Der Wirkstoff ist in Wasser wenig löslich.
TEGRETOL 200 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Alternative: Tegretol Sirup oder Supp.
TEGRETOL CR 400 MG : Divitabs	Ja	kA	Nein		Vorschlag: Tegretol Sirup oder Supp.
TEMESTA 1.0 EXPIDET : Disoltablets	Ja	Ja	kA	--	Temesta expidet Disoltablets lösen sich innerhalb von Sekunden nach Kontakt mit Flüssigkeit auf.
TEMGESIC 0.2 MG : Sublingual-Tabletten	Ja	Nein	Nein	--	Nicht zerbeissen oder schlucken.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					Alternative: Temgesic Injektionslösung verwenden.
TEMODAL 20, 100, 250 MG : Kapseln	--	Nein	Nein	Nein	Bei Beschädigung einer Kapsel darf der Pulverinhalt nicht mit der Haut oder mit Schleimhäuten in Berührung gebracht werden. Betroffene Stelle abwaschen!
TENORETIC : Tabletten	Ja	Nein	Nein	--	
TENORMIN 100 MG : Tabletten	Ja	Möglich	Möglich	--	Resorption kann verändert sein
TENORMIN MITE 50 MG : Tabletten	Ja	Möglich	Möglich	--	Resorption kann verändert sein
TENORMIN SUBMITE 25 MG : Tabletten	Ja	Möglich	Möglich	--	Resorption kann verändert sein
TIAPRIDAL 100 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	
TOLVON 30 und 60 MG : Tabletten	Ja	Nein	Ja*	--	*Resorption kann verändert sein
TOQUILONE COMPOSITUM : Tabletten	Ja	kA	kA	--	Tabletten mit Bruchrille
TORA-DOL 10 MG : Tabletten	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Tora-Dol Ampullen i.m. oder i.v. applizieren.
TORASIS 5, 10, 20, 200 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren
TORASIS 2.5 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	kA	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren
TORECAN 6.5 MG : Dragees	Ja (Schwierig)	kA	Ja	--	Das Teilen der Dragées ist schlecht praktikabel, jedoch grundsätzlich erlaubt.
TOREM 5, 10, 200 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Tabletten mit Kreuzrille. Die zerbröckelten Tabletten können auch in Joghurt eingerührt verabreicht werden.
TRAMAL 50 MG : Kapseln	Nein	Ja	--	Ja	Alternative: Tramal Tropfen oder Suppositorien
TRAMAL RETARD 100, 200 MG : Tabletten	Ja	Nein	Nein	--	Die Tabletten können mittels Tablettenteiler halbiert werden, dürfen jedoch nicht weiter zerkleinert werden.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					Alternative: Tramal Tropfen oder Suppositorien
TRANDATE 200 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Für die Verabreichung über die Sonde können die Tabletten in Wasser aufgeschwemmt werden, Resorption kann verändert sein.
TRAUMANASE FORTE 40 MG : Dragees	Nein	Nein	Nein	--	Unzerkaut schlucken
TRENTAL 400 MG : Dragees	Nein	Nein	Nein	--	Retardprinzip wird durch Zerkleinerung zerstört.
TRIALIX 5/6 MG: Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Keine Sondenapplikation möglich
TRIA TEC 5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	kA	Ja	--	
TRIMIN : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	Tabletten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit nehmen; Sondengabe: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser aufschlännen, sofort anwenden
TRITTICO 50 MG : Tabletten	Teilbar	Suspendierbar	Ja	--	
UBRETID 5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Veränderte Resorption möglich. Die Tabletten müssen nüchtern ½ h vor dem Frühstück eingenommen werden.
UNIFYL CONTINUS 400 MG : Retardtabletten	Ja	Nein	Nein	--	Es handelt sich um Matrixtabletten. Sie können halbiert, jedoch nicht weiter zerkleinert werden.
UROMITEXAN 400 MG : Filmtabletten	Ja	Ja	Ja	--	
URSOCHOL 150 UND 300 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
UTROGESTAN 100 und 200 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	
VALIUM 5 MG und 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	
VALORON 50 MG : Kapseln	Nein	Ja	Ja	Ja	Wenn möglich Tropfen verwenden.
VALTRESX 250 und 500 MG : Tabletten	Nein	Nein	Ja	--	Nach dem Essen geben.
VEPESID 50 MG : Kapseln	Nein	Nein	Nein	Nein	
VERMOX 100 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	möglichst mit fettreicher Nahrung



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					einnehmen.
VESICARE 5 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Bitterer Geschmack!
VIBRAMYCIN 100 MG : Tabs	Nein	Ja	Nein	--	Tabs in ca. 50 ml Wasser suspendieren, 1 h vor dem Essen geben
VIRACEPT 250 MG : Filmtabletten	Nein	Ja (mit Wasser)	Ja	--	Keine Fruchtsäfte verwenden! Alternative: Viracept Pulver
VIREAD 245 MG: Filmtabletten	Keine Bruchrille	Ja	möglich	--	In mind. 100 ml Wasser, Orangen- oder Traubensaft auflösen.
VITAMIN B2 : Tabletten	Nein	In Wasser suspendierbar	Ja, mörsern möglich	--	
VITIRON : Brausetabletten	Nein	Ja	Nein	--	In mind. 50 ml Flüssigkeit verdünnen.
VOLTAREN 25 und 50 MG : Dragees	Nein	Nein	Nein	--	Magensaftresistente Dragées. Vorschlag: Voltaren Dispersible Tabletten verwenden.
VOLTAREN RAPID 50 MG : Dragees	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Voltaren Dispersible Tabletten verwenden (zerfallen rasch in Wasser). Weitere Möglichkeiten: Voltaren Ampullen i.m. oder i.v., Voltaren Tropfen oder Suppositorien.
VOLTAREN RETARD 100 MG : Dragees	Nein	Nein	Nein	--	Vorschlag: Voltaren Dispersible Tabletten verwenden (zerfallen rasch in Wasser). Weitere Möglichkeiten: Voltaren Ampullen i.m. oder i.v., Voltaren Tropfen oder Suppositorien.
XANAX : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja		Mit (fettiger) Nahrung ist die Resorption erhöht.
XELODA 150 und 500 MG : Filmtabletten	Nein	s. Bemerkung	Nein, siehe Bemerkung	--	Zytostatikum! Sehr bitterer Wirkstoff! Tabletten können unter Vorsichtsmassnahmen in Wasser suspendiert und sofort per Sonde appliziert werden.
XENALON 50 MG : Lactabs	Ja (Bruchrille)	Nein	Ja	--	Vor dem Essen einnehmen.



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
					Sondengabe: zermörsern, in Wasser suspendieren und sofort applizieren (lichtempfindlicher Wirkstoff). Bei Duodenal- und Jejunalsonden kann es zu Problemen kommen (Lack).
XYZAL 5 MG : Tabletten	Ja	schwierig	Ja	--	Tabletten sind schwierig zu suspendieren, Sonde kann verstopfen; Abends einnehmen
ZANTIC 300 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Nein	Ja	--	Reosrption kann verändert sein und der Wirkstoff schmeckt bitter. Vorschlag: Zantic Brausetabletten oder Inj.lösung.
ZEFFIX 100 MG: Filmtabletten	Ja (keine Bruchrille)	kA	Ja	--	Zur Sondenapplikation sind keine Daten vorhanden. Alternative: Suspension
ZELMAC 6 MG : Tabletten	Nein	kA	kA	--	
ZESTORETIC : Tabletten	Ja	Möglich (siehe Bemerkung)	Ja	--	s.o.
ZESTORETIC MITE : Tabletten	Ja	Möglich (siehe Bemerkung)	Ja	--	Die Tabletten enthalten Stärke, so dass die Lösungen viskös werden können; deshalb etwas stärker verdünnen.
ZESTRIL 10 MG : Tabletten	Ja	Ja	Ja	--	nicht lösliche Rückstände müssen mittels eines Filters entfernt werden.
ZESTRIL 20 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	nicht lösliche Rückstände müssen mittels eines Filters entfernt werden.
ZESTRIL 5 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	nicht lösliche Rückstände müssen mittels eines Filters entfernt werden.
ZIAGEN 300 MG : Filmtabletten	Nein	Nein	Ja (aber bitter)	--	Alternative: Ziagen Lösung
ZINAT 250 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	Resorption evtl. verändert; Alternative: Zinat Suspension oder Injektionslösung
ZINK NUTRIMED CITRON : Brausetabletten	Ja	Ja	Ja	--	In mind. 50 ml Flüssigkeit verdünnen
ZITHROMAX 250 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja	Ja	--	Keine Bruchrille, Tablettenteiler verwenden; besser Sachets oder Pulver



Arzneimittel	teilbar	auflösbar od. suspendierbar	zermörserbar	Öffnen von Kapseln	Bemerkungen/Alternativen
ZOCOR 20 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Ja	Ja	--	Tablette mit Bruchrille; Zermörsern und suspendieren in Wasser ist theoretisch möglich, jedoch keine Studien bezüglich Pharmakokinetik vorhanden.
ZOFRAN ZYDIS 4 MG : Lingualtabletten	kA	Ja	kA	--	Die Lingualtabletten lösen sich beim Kontakt mit Speichel schnell auf. Bei Patienten mit Sonde kann die Lingualtablette auch in wenig Wasser gelöst verabreicht werden.
ZOFRAN ZYDIS 8 MG : Lingualtabletten	kA	Ja	kA	--	s.o.
ZOLDORM 10 MG : Filmtabletten	Ja	kA	Ja	--	Sondenapplikation: Tablette mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren
ZOLOFT 50 MG : Tabletten	Ja (Bruchrille)	Nein	Ja	--	Nach Zerkleinern Tablette sofort einnehmen und mit genügend Wasser nachspülen. Die Herstellung einer Suspension wird nicht empfohlen. Vorschlag: Zoloft orales Konzentrat flüssig verwenden. Konzentrat vor der Einnahme in einer halben Tasse Wasser oder Orangensaft verdünnen.
ZOVIRAX 200 MG : Tabletten	Nein	Nein	Ja	--	Der Wirkstoff ist schwer löslich. Vorschlag: Zovirax Suspension verwenden.
ZOVIRAX 800 MG : Tabletten	Nein	Ja	(Ja)	--	Suspendierbar in mind. 50 ml Wasser Alternative: Zovirax Suspension (s.o.)
ZYPREXA 5 und 10 MG : Tabletten	Ja (mit Tablettenteiler)	Ja, besser sind Velotabs	kA	--	Alternative: Velotab Tabletten
ZYRTEC 10 MG : Tabletten	Ja	kA	Ja	--	
ZYVOXID 600 MG: Filmtabletten	Keine Bruchrille	Nach zermörsern	Ja	--	Sondenapplikation möglich, sofort verabreichen Alternative: orale Suspension

